

Nazwa diety	DIETA BOGATOBIAŁKOWA
Zastosowanie	<p>Dla osób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w okresie rekonwalescencji np. po zabiegu chirurgicznym, po udarze mózgu; 2) z silnymi/rozległymi oparzeniami; 3) z odleżynami; 4) z rozległymi zranieniami; 5) w chorobach nowotworowych; 6) z wyrównaną marskością wątroby; 7) z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby; 8) z zespołem nerczycowym; 9) leczonych za pomocą dializy; 10) z przewlekłą niewydolnością krążenia – w zależności od stopnia niewydolności; 11) z chorobą Cushinga; 12) z nadczynnością tarczycy; 13) z niedoczynnością tarczycy; 14) z chorobami przebiegającymi z długotrwałą, wysoką gorączką. 15) z wyniszczeniem organizmu; 16) osoby w wieku podeszłym; 17) w infekcjach przebiegających z gorączką; 18) pacjenci z nadwagą i otyłością; 19) pacjenci po zabiegach bariatrycznych.
Zalecenia dietetyczne	<ol style="list-style-type: none"> 1) jest modyfikacją diety łatwostrawnej, w której zawartość białka wynosi 1,5–2,0 g/kg należnej masy ciała lub 100–130 g białka/dobę; 2) wartość energetyczna i odżywcza diety dostosowywana jest do masy ciała i stanu fizjologicznego pacjenta, w oparciu o aktualne normy żywienia dla populacji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wytyczne towarzystw naukowych w zakresie żywienia; 3) w przypadku chorych bardzo wyniszczonych, gorączkujących wartość energetyczna diety powinna być wyższa, natomiast chorzy leżący, bez gorączki wymagają diety na poziomie ok. 2000 kcal; 4) w sytuacji, w której pokrycie zapotrzebowania na białko z wykorzystaniem wyłącznie produktów spożywczych nie jest możliwe po zaleceniu lekarskim zasadne jest uzupełnienie diety o żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (doustne preparaty odżywcze/żywnienie medyczne/FSMP) z wysoką zawartością białka lub wykorzystywanie do przygotowania posiłków produktów żywienia medycznego – typu Nutridrink lub wykorzystywanie do przygotowania posiłków odżywek białkowych w proszku np. Resource Instant Protein lub Protifar; 5) dieta powinna być prawidłowo zbilansowana i urozmaicona pod kątem udziału grup produktów spożywczych: produktów zbożowych, mlecznych, warzyw i owoców, ziemniaków, produktów mięsnych i ryb, nasion roślin strączkowych oraz tłuszczów; 6) posiłki powinny być podawane 5 razy dziennie zgodnie z zaleceniami lekarza lub dietetyka, zwracając uwagę na rozłożenie produktów białkowych na wszystkie posiłki; 7) dieta powinna być różnorodna, urozmaicona pod względem smaku, kolorystyki, konsystencji i strawności potraw oraz obróbki termicznej;

- 8) w każdym posiłku należy uwzględnić wodę lub napój – w przypadku kompotu zawartość cukru dodanego nie może być większa niż 5 g cukru w 250 ml kompotu, pozostałe napoje (np. kawa, herbata) powinny być przygotowywane bez cukru;
- 10) dodatek warzyw lub owoców do każdego posiłku (minimum 400 g dziennie – do gramatury nie są wliczane ziemniaki i bataty), z przewagą warzyw, przynajmniej część warzyw i owoców powinna być serwowana w postaci surowej;
- 11) mleko i przetwory mleczne, w tym napoje fermentowane lub produkty roślinne zastępujące produkty mleczne powinny być podawane co najmniej w 2 posiłkach w ciągu dnia, jeżeli nie ma przeciwwskazań;
- 12) każdego dnia należy podawać co najmniej 1 porcję z grupy mięso lub jaja lub inne roślinne zamienniki białka zwierzęcego np. na bazie nasion roślin strączkowych lub glutenu pszennego, jeżeli są dobrze tolerowane i nie ma przeciwwskazań;
- 13) ryby lub przetwory rybne (głównie z ryb morskich) należy uwzględnić co najmniej 2 razy w tygodniu;
- 14) przynajmniej 1 posiłek w ciągu dnia powinien zawierać produkty bogate w kwasy tłuszczowe nienasycone;
- 15) tłuszcze zwierzęce (takie jak smalec, słonina, łój wołowy, smalec gęsi) należy całkowicie wyeliminować z diety. Nie należy używać ich ani do przygotowywania potraw na ciepło, ani na zimno. Jedynym tłuszczem zwierzęcym, który zaleca się stosować w niewielkich ilościach, w postaci surowej, na zimno (np. do smarowania pieczywa lub jako dodatek do warzyw po ugotowaniu) jest masło. Podstawowym źródłem tłuszczu w jadłospisie powinny być tłuszcze roślinne – np. olej rzepakowy, lniany, oliwa z oliwek czy miękkie margaryny. Wyjątek stanowią olej kokosowy i olej palmowy, które nie są zalecane i również należy je wykluczyć;
- 16) przynajmniej 1 posiłek w ciągu dnia powinien zawierać produkty bogate w kwasy tłuszczowe nienasycone;
- 17) należy eliminować cukry dodane (tj. monocukry i dwucukry dodawane do żywności);
- 18) wskazane jest ograniczenie potraw ciężkostrawnych i wzdymających;
- 19) dopuszcza się okazjonalne włączenie wybranych produktów świątecznych, związanych z tradycjami narodowymi, pod warunkiem, że są one planowane w umiarkowanych ilościach, a ich skład i sposób przygotowania nie obciąża przewodu pokarmowego (np. unikanie produktów tłustych, smażonych lub ciężkostrawnych dodatków). Wprowadzenie tych produktów powinno być dostosowane do zasad diety łatwostrawnej.

Przy doborze produktów należy zwrócić uwagę na ich:

- 1) jakość;
- 2) termin przydatności do spożycia;
- 3) sezonowość.

Stosowane techniki kulinarne:

- 1) gotowanie tradycyjne lub na parze;
- 2) duszenie bez wcześniejszego obsmażania;
- 3) pieczenie bez dodatku tłuszczu, np. w folii aluminiowej, w rękawach do pieczenia, pergaminie, naczyniach żaroodpornych;
- 4) grillowanie bez dodatku tłuszczu, na patelni grillowej lub grillu elektrycznym.

	<p>Praktyczne wskazówki dotyczące sporządzania posiłków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zupy, sosy oraz potrawy należy sporządzać z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników; 2) w celu zwiększenia zawartości białka w diecie, celowe jest wzbogacanie potraw w produkty bogatobiałkowe np. odżywka białkowa, jogurty proteinowe; 3) zaleca się uzupełnienie diety o żywność medyczną; 4) nie dodawać do potraw zasmażek; 5) do minimum ograniczyć cukier dodawany do napojów i potraw; do minimum ograniczyć dodatek soli na rzecz ziół i naturalnych przypraw. 	
Wartość energetyczna	Energia (En)	1800–2400 kcal/dobę
Wartość odżywcza	Białko	<p>Wartości referencyjne:</p> <p>1,5–2,0 g/kg należnej masy ciała</p> <p>2,0–3,0 g/kg należnej masy ciała przy silnych oparzeniach dużej powierzchni ciała</p>
		100–130 g/d, w tym 1/2–2/3 białko Pochodzenia zwierzęcego, o dużej wartości biologicznej
	Tłuszcz ogółem	<p>Wartości referencyjne: 20–30 % En</p> <p>22–33 g/1000 kcal</p>
	w tym nasycone kwasy tłuszczowe	<p>Wartości referencyjne: możliwie jak najmniej, jednak nie więcej niż 10 % En</p> <p>≤ 11 g/1000 kcal</p>
	Węglowodany ogółem	<p>Wartości referencyjne: 50–55 % En</p> <p>125–138g/1000 kcal</p>
	w tym cukry (mono- i disacharydy)	<p>Wartości referencyjne: ≤10 % En</p> <p>≤ 25 g/1000 kcal</p>
	Błonnik	20-40 g/dobę
	Sód	≤ 2000 mg/dobę
Grupy środków spożywczych	Produkty rekomendowane	Produkty przeciwwskazane
Produkty zbożowe	<ol style="list-style-type: none"> 1) mąka ziemniaczana, pszenna, kukurydziana, żytnia, ryżowa; 2) pieczywo średnioziarniste typu Graham, bez dodatku substancji słodzących; 3) białe pieczywo pszenne, żytnie i mieszane, czerstwe; 4) kasze: mało- i średnioziarniste: krakowska, jęczmienna wiejska, mazurska, perłowa, orkiszowa, bulgur, jagłana, manna, kukurydziana; 5) płatki zbożowe błyskawiczne, np.: owsiane, jęczmienne, ryżowe, żytnie, muesli bez dodatku cukru i jego zamienników np.: syropu glukozowo-fruktozowego; 6) makarony drobne; 7) sago; 8) ryż biały; 9) potrawy mączne, np.: naleśniki, 	<ol style="list-style-type: none"> 1) pieczywo z dodatkiem cukru, słodcy, syropów, miodu, karmelu, chleb razowy; 2) rogaliki francuskie (croissanty); 3) produkty mączne smażone w dużej ilości tłuszczu, np.: pączki, faworki, racuchy; 4) płatki kukurydziane i inne słodzone płatki śniadaniowe, np.: cynamonowe, czekoladowe, miodowe; 5) kasze gruboziarniste.

	pierogi, kopytka, kluski (w ograniczonych ilościach).	
Warzywa i przetwory warzywne	<ol style="list-style-type: none"> 1) warzywa gotowane: marchew, szpinak, buraki, pietruszka, kalarepa, dynia, kabaczki, fasolka szparagowa, groszek zielony – najczęściej przetarty w formie zupy lub puree, róża kalafiora, róża brokołu – z dodatkiem świeżego masła lub margaryny; 2) warzywa na surowo: sałata, cykoria, pomidor bez skóry, starta marchewka; 3) surówki z kapusty włoskiej i pekińskiej (w ograniczonych ilościach). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) kapusty: biała, czerwona, kiszona, brukselka; 2) warzywa cebulowe: cebula, czosnek, por, szczypior; 3) suche nasiona roślin strączkowych; 4) ogórek, papryka, rzodkiewki (na surowo); 5) warzywa przyrządzane z dużą ilością tłuszczu; 6) warzywa marynowane; 7) warzywa grubo starte.
Ziemniaki, Bataty	<ol style="list-style-type: none"> 1) ziemniaki, bataty: gotowane, pieczone. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ziemniaki, bataty: smażone (frytki, talarki); 2) puree w proszku.
Owoce i przetwory owocowe	<ol style="list-style-type: none"> 1) owoce dojrzałe lub rozdrobnione: jabłka, wiśnie, morele, brzoskwinie, melony, owoce cytrusowe, banany – jeżeli dobrze tolerowane; 2) przeciery i musy owocowe z niską zawartością lub bez dodatku cukru (w ograniczonych ilościach); 3) owoce drobnopestkowe, np.: porzeczka, agrest, maliny, jagoda, truskawki (wyłącznie w przypadku złej tolerancji - pozbawione pestek, przetarte przez sito). 4) dżemy owocowe niskosłodzone (z owoców bezpestkowych w ograniczonych ilościach). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) wszystkie owoce niedojrzałe: śliwki, gruszki, czereśnie, agrest; 2) owoce w syropach cukrowych; 3) owoce kandyzowane; 4) przetwory owocowe wysokosłodzone; 5) owoce suszone.
Nasiona roślin strączkowych	<ol style="list-style-type: none"> 1) produkty z nasion roślin strączkowych: niesłodzone napoje roślinne, tofu naturalne, jeżeli dobrze tolerowane. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) produkty z nasion roślin strączkowych z dużą ilością soli.
Nasiona, pestki, orzechy	<ol style="list-style-type: none"> 1) zmielone pestki słonecznika, dyni, sezam, siemię lniane, orzechy – spożycie uzależnione od indywidualnej tolerancji pacjenta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) orzechy – jeżeli źle tolerowane; 2) „masło orzechowe” solone.
Mięso i przetwory mięsne	<ol style="list-style-type: none"> 1) z małą zawartością tłuszczu, np.: drób bez skóry (kura, kurczak, indyk), chuda wołowina, cielęcina, jagnięcina, królik, chude partie wieprzowiny, np.: 2) polędwica, schab, szynka; chude gatunki wędlin niemielonych: drobiowych, wieprzowych, 	<ol style="list-style-type: none"> 1) z dużą zawartością tłuszczu, np.: tłusty drób (kaczka, gęś), tłusta wołowina i wieprzowina, baranina; 2) mięsa peklowane oraz z dużą zawartością soli; 3) mięsa smażone i duszone w tradycyjny sposób; w panierce 4) tłuste wędliny, np.: baleron, boczek;

	<p>wołowych;</p> <p>3) pieczone pasztety z chudego mięsa;</p> <p>4) galaretki drobiowe.</p>	<p>5) kiełbasy, parówki, mielonki, mortadele,</p> <p>6) pasztety;</p> <p>7) wędliny podrobowe (pasztetowa, wątrobianka, salceson);</p> <p>8) mięsa surowe np. tatar;</p> <p>9) konserwy mięsne.</p>
Ryby i przetwory rybne	<p>1) wszystkie chude ryby morskie i słodkowodne;</p> <p>2) ryby tłuste – w ograniczonej ilości, jeżeli są dobrze tolerowane.</p>	<p>1) ryby surowe;</p> <p>2) ryby w occie;</p> <p>3) ryby smażone na dużej ilości tłuszczu; panierowane</p> <p>4) ryby wędzone;</p> <p>5) konserwy rybne.</p>
Jaja i potrawy z jaj	<p>1) gotowane na miękko;</p> <p>2) jaja sadzone i jajecznica na parze;</p> <p>3) jaja w potrawach np. makaronie.</p>	<p>1) jaja gotowane na twardo;</p> <p>2) jaja przyrządzane z dużą ilością tłuszczu;</p> <p>3) jaja smażone na tłuszczu, słoninie, skwarkach, tłustej wędlinie.</p>
Mleko i produkty mleczne	<p>1) mleko i sery twarogowe chude lub półtłuste;</p> <p>2) serek naturalny homogenizowany;</p> <p>3) naturalne napoje mleczne fermentowane, bez dodatku cukru (np. kefir, jogurt, maślanka);</p> <p>4) jogurty bogatobiałkowe typu skyr, jogurty proteinowe.</p>	<p>1) mleko i sery twarogowe tłuste;</p> <p>2) mleko skondensowane;</p> <p>3) jogurty i desery mleczne z dodatkiem cukru;</p> <p>4) tłuste sery dojrzewające;</p> <p>5) śmietana.</p>
Tłuszcze	<p>1) masło (w ograniczonych ilościach);</p> <p>2) miękka margaryna;</p> <p>3) oleje roślinne, np.: rzepakowy, oliwa z oliwek.</p>	<p>1) BEZWZGLĘDNIE ZAKAZANE: tłuszcze zwierzęce, np.: smalec wieprzowy, łój wołowy, słonina;</p> <p>2) twarde margaryny;</p> <p>3) masło klarowane;</p> <p>4) tłuszcz kokosowy i palmowy;</p> <p>5) „masło kokosowe”;</p> <p>6) frytura smaźalnicza.</p>
Desery (w ograniczonych ilościach)	<p>1) kisiele, kompoty, musy, galaretki – z owoców dozwolonych;</p> <p>2) galaretki, kisiele, kremy, budynie z mleka;</p> <p>3) owoce w galaretkce lub kremie;</p> <p>4) biszkopty;</p> <p>5) ciasto drożdżowe;</p> <p>6) budyń (bez dodatku cukru lub z małą ilością cukru – do 5 g/250 ml użytego mleka);</p> <p>7) galaretka (bez dodatku cukru lub z małą ilością cukru);</p> <p>8) kisiel (bez dodatku cukru lub z małą ilością cukru);</p> <p>9) sałatki owocowe z owoców dozwolonych bez dodatku cukru.</p>	<p>1) słodycze zawierające duże ilości cukru lub tłuszczu;</p> <p>2) torty i ciasta z masami cukierniczymi, kremami cukierniczymi, bitą śmietaną;</p> <p>3) ciasta kruche z dużą ilością tłuszczu;</p> <p>4) ciasto francuskie;</p> <p>5) ciasta z dodatkiem proszku do pieczenia;</p> <p>6) czekolada;</p> <p>7) wyroby czekoladopodobne.</p>

Napoje	<ol style="list-style-type: none"> 1) woda niegazowana, woda mineralna niegazowana; 2) słabe napary herbat; 3) napary ziołowe – słabe napary; 4) kawa zbożowa; 5) bawarka; 6) soki warzywne; 7) soki owocowe (w ograniczonych ilościach); 8) kompoty (bez dodatku cukru lub z małą ilością cukru – do 5 g/250 ml); 9) słabe napary kawy naturalnej. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) napoje wysokosłodzone; 2) nektary owocowe; 3) wody smakowe z dodatkiem cukru; 4) mocne napary kawy naturalnej; 5) kakao.
Przyprawy	<ol style="list-style-type: none"> 1) łagodne naturalne przyprawy ziołowe i korzenne np. cynamon, wanilia, koper, kminek, anyżek, pietruszka, kwas cytrynowy, sok z cytryny; 2) sól (w ograniczonych ilościach); 3) chrzan i ćwikła na kwasu cytrynowym (w ograniczonych ilościach). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) kostki rosółowe i esencje bulionowe; 2) gotowe bazy do zup i sosów; 3) gotowe sosy sałatkowe i dressingi; 4) musztarda, keczup; 5) ocet; 6) chrzan i ćwikła na occie; 7) sos sojowy; 8) przyprawy wzmacniające smak w postaci płynnej i stałej; 9) przyprawy ostre.

PRZYKŁADOWE JADŁOSPISY DLA DIETY BOGATOBIAŁKOWEJ

Dzień 1

- Śniadanie - Kawa z mlekiem 250ml, masło 20g, chleb pszenno -żytni, serek ziarnisty 150g, szynka gotowana 70g, rzodkiewka
- Obiad - Kalafiorowa z makaronem 400ml, pierś z kurczaka pieczona w jarzynach 100g, sos pieczarkowy 100ml, ziemniaki 200g, buraczki duszone ze śmietaną 200g, mandarynka 1 szt., kompot z jabłek 250ml
- Kolacja - Herbata owocowa 250ml, serek typu almette 20g, bułki grahamki 2 szt., ser żółty 70g, sałatka hawajska z kurczakiem, ryżem i jarzynami z majonezem i jogurtem 100g, pomidor bez skórki 100g.

Dzień 2

- Śniadanie - Kakao z mlekiem 250ml, graham 70g, bułka pszenna 1szt., płatki owsiane na mleku 400ml, dżem 50g, twaróg z koperkiem 70g, papryka 100g
- Obiad - Barszcz ukraiński z ziemniakami i fasolą Jaś 400ml, pierogi z serem 400g, jogurt owocowy 150g, kompot z aronii 250ml
- Kolacja - Kawa z mlekiem 250ml, szynka konserwowa 70g, ser typu almette 30g, ogórek świeży 100g

Dzień 3

- Śniadanie - Herbata owocowa 250ml, grysik na mleku 400ml, serek homogenizowany naturalny 150g, chleb graham 70 g, pomidorki cocktailowe 100g
- Obiad - Pomidorowa z ryżem 400ml, schab faszerowany śliwką 100g, sos naturalny 100ml, ziemniaki 200g, sałatka z czerwonej kapusty z olejem 150g, kefir 150g, kompot z jabłek 250ml
- Kolacja - Kawa z mlekiem 250ml, masło 20g, pasta z jaj ze szczypiorkiem ze śmietaną i jogurtem 100g, polędwica sopocka 50g, ogórek kiszony 100g