

Procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2

1. Pacjent podejrzanym leży na osobnej sali z dostępem łazienki jeżeli nie ma należy zorganizować indywidualny zestaw sanitarny (basen, miska do toalety) dedykowany tylko dla tej osoby.
2. Na Sali znajduje się dla tego pacjenta termometr, ciśnieniomierz, stetoskop i niezbędny sprzęt którego nie wynosimy z sali. Po badaniu dezynfekujemy poprzez przecieranie używanego sprzętu środkiem dezynfekcyjnym będącym również na wyposażeniu Sali. Przy wyjściu znajduje się czerwony worek na odpady, przy umywalce środek myjący i dezynfekujący.
3. Przed salą znajduje się stolik na którym jest: fartuch jednorazowy, barierowy, czepki, rękawiczki, масечzki chirurgiczne i z filtrem Hepa, przyłbica lub okulary ochronne, środek dezynfekcyjny do przecierania sprzętu.
4. Sala chorego jest zawsze zamknięta, na drzwiach sali piktogram (czerwone kółko) informujące o izolacji.
5. Do chorego wytypowana jest jedna pielęgniarka na dyżur, jedna salowa i jeden lekarz.
6. Do pacjenta wchodzimy tylko w razie potrzeby, staramy się wykonać wszystkie niezbędne zabiegi, badania itp. Podczas jednego wejścia.
7. Wchodzimy w zabezpieczeniu ochronnym tj: dezynfekcja rąk, zakładamy rękawiczki, zakładamy fartuch barierowy, czepek, масечzkę z filtrem Hepa, google i przyłbicę i rękawiczki, które zakładamy na rękawy fartucha.
8. Po wejściu na salę do pacjenta wykonujemy niezbędne czynności wcześniej zaplanowane tak aby przy jednym wejściu wykonać wszystkie niezbędne zabiegi. Z pacjentem pomiędzy wejściami komunikujemy się telefonicznie.
9. Po zakończeniu rozbieramy się na sali pacjenta wg kolejności : dezynfekujemy rękawiczki i odwiązujemy troki fartucha chwytając za przednią zewnętrzną część, ściągamy razem z zewnętrznymi rękawiczkami , zwijamy zewnętrzną częścią do środka i wyrzucamy do odpadów zakaźnych znajdujących się w izolacji. Dezynfekujemy wewnętrzne rękawiczki, jeżeli mamy zabezpieczenie na buty, ściągamy i wyrzucamy do czerwonego worka. Następnie dezynfekujemy rękawiczki i zdejmujemy przyłbicę chwytając za tylną część, dezynfekujemy przyłbicę poprzez przetarcie zewnętrznej części środkiem dezynfekcyjnym (gaziki dezynfekujące lub chusteczki dezynfekujące (wirusobójcze), które znajdują się w pokoju pacjenta. Trzymając w ręce przyłbicę wychodzimy z izolacji a drzwi otwiera nam z zewnątrz asystująca pielęgniarka .
10. Wchodzimy do dyżurki zabiegowej i odkładamy przyłbicę do naczynia w której będziemy dezynfekować przyłbicę . Dezynfekujemy rękawiczki i wyrzucamy do odpadów zakaźnych. Myjemy i dezynfekujemy ręce i zakładamy nowe rękawiczki. Zdejmujemy google (odkładamy do naczynia gdzie dezynfekujemy przyłbicę), dezynfekujemy rękawiczki , zdejmujemy масечkę, dezynfekujemy rękawiczki i zdejmujemy czepek. Rękawiczki wyrzucamy do worka czerwonego. Myjemy i dezynfekujemy ręce.

DYREKTOR SZPITALA

01 KWI. 2020

Dr med. Andrzej Kosiniak-Kamys